



METEO

Evoluzione generale: Fino a giovedì persisterà una depressione proveniente da nord-ovest; ci saranno varie piogge, specie tra martedì e mercoledì, con temperature in calo verso valori anche inferiori alle medie tipiche di metà giugno. Tra venerdì e sabato pressione in aumento, non si verificheranno precipitazioni e temperature in aumento.

Vicenza 45.55°N / 11.55°E (39m slm)

meteoblue



Pinot Grigio, Sarego, 12/6/2018

SITUAZIONE VEGETATIVA

Procede spedito il l'accrescimento della nuova vegetazione formatasi conseguentemente alle operazioni di cimatura. Le temperature elevate e la disponibilità idrica hanno favorito un avanzamento veloce della fase fenologica che, allo stato attuale, appare anticipata anche nei confronti dello scorso anno.

FENOLOGIA

GLERA, CHARDONNAY, PINOT GRIGIO, PINOT BIANCO, PINOT NERO : INIZIO CHIUSURA GRAPPOLO
MERLOT, SAUVIGNON, TOCAI ROSSO, MARZEMINO, VESPAIOLA : ACCRESCIMENTO ACINI
GARGANEGA, TREBBIANO TOSCANO, MANZONI BIANCO, CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON: ACINO GRANO DI PEPE



Garganega, Montebello V.no, 12/6/2018


INTERVENTI AGRONOMICI

Gli interventi agronomici in questo periodo sono tutti orientati alla sistemazione della chioma che deve presentarsi non troppo folta e tale da permettere la corretta penetrazione di luce, aria e dei trattamenti fitosanitari. Gli interventi sulla fascia grappoli, volti all'eliminazione di parte delle vegetazione, debbono essere ridotti al minimo e possibilmente rivolti verso la parete vegetativa rivolta ad est, nord-est. Questo accorgimento aiuterà a ridurre i fenomeni di scottature a carico degli acini tanto deleterie sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Operativamente se si intende effettuare qualche intervento in questo senso è importante mantenere la barra di taglio della potatrice in posizione obliqua rispetto al filare cercando di fare in modo che la parte alta della chioma resti più spessa e sia in grado di ombreggiare in parte la fascia grappoli.




Glera, Montebello V.no, 12/6/2018





PERONOSPORA

Situazione: la presenza di infezioni è ancora molto limitata nei vigneti trattati razionalmente. Si registrano attacchi virulenti sui testimoni non trattati. Secondo i modelli previsionali delle infezioni, domani si dovrebbe assistere all'evasione di eventuali attacchi originatisi con le piogge di giovedì 7 giugno.
 Il trattamento indicato entro lunedì 11 dovrebbe garantire una protezione adeguata per almeno 8/10 giorni, indipendentemente dall'andamento pluviometrico, per cui al momento non si ritiene necessario intervenire contro questo patogeno.
Difesa integrata: non si consigliano interventi specifici.



OIDIO

Situazione: le attuali condizioni meteorologiche sono potenzialmente in grado di fare germinare le ascospore e dare inizio ad infezioni primarie. I modelli previsionali indicano un pericolo elevato di avvio di infezioni primarie, e da questo momento inizia una fase in cui le condizioni di sviluppo del fungo sono particolarmente favorite dalle temperature elevate e dall'umidità ambientale. La situazione attuale che si evidenzia dal monitoraggio indica comunque l'assenza quasi totale di infezioni da parte di questo patogeno. Il trattamento indicato entro lunedì 11 giugno è attualmente in grado di proteggere efficacemente la vegetazione
Difesa integrata: non si consigliano interventi specifici.



TIGNOLETTA

Situazione: le trappole per il monitoraggio del volo degli adulti indicano che in molti siti del territorio provinciale è partito il volo della seconda generazione. Specificamente nella zona di Montebello Vic.no, Gambellara, Monticello di Fara ed Almisano, vicino al confine provinciale veronese, si registrano catture molto elevate per cui la difesa dovrà essere particolarmente attenta. La deposizione delle uova sarà sicuramente ostacolata dalle forti piogge, in ogni caso, se si intende effettuare il primo trattamento con un prodotto ovicida (**Clorantraniliprole**), si può programmare di posizionarlo correttamente verso la fine della settimana corrente o l'inizio della prossima, trattando possibilmente la sola fascia grappoli. Per l'utilizzo dei prodotti ad azione ovolarvicida o larvicida è necessario attendere i prossimi risultati del monitoraggio sul volo e sulla ovideposizione.
Difesa integrata: trattamento con prodotti ovicidi verso la fine settimana corrente, inizio della prossima



CICALINA DELLA FLAVESCENZA DORATA

Situazione: Si incominciano ad evidenziare piante sintomatiche da presenza di giallumi; il monitoraggio sulla biologia dell'insetto, effettuato venerdì 7 giugno, evidenzia la presenza di una popolazione formata da circa il 40% di neanidi di prima età, un 45% di seconda ed un 15% di terza età. Come è noto questo cicadellide è in grado di trasmettere il fitoplasma responsabile della Flavescenza Dorata solo dallo stadio di neanide di terza età inoltre, essendo la schiusura delle uova molto scalare, è opportuno aspettare più possibile prima di effettuare il trattamento in modo che la maggioranza della popolazione sia oggetto dell'azione dell'insetticida. Attualmente è possibile posizionare un intervento insetticida con Buprofezin nel fine settimana (attenzione alla revoca dell'utilizzo stabilita al 20 giugno), oppure nel caso di vigneti condotti con metodo biologico il primo trattamento a base di **piretro naturale**, mentre per l'utilizzo di prodotti abbattenti (Acetamiprid, Thiamethoxam), si rimanda al prossimo bollettino in funzione del monitoraggio previsto per venerdì 15 giugno.
Difesa integrata: trattare nel prossimo fine settimana, e non oltre il 20 giugno, con regolatore di crescita (Buprofezin)



In verde sono riportate le molecole autorizzate in agricoltura biologica.

SINTESI PER SMS

Prossimo bollettino: martedì 19 giugno 2018

AVVERTENZE

La **difesa integrata** indica come preferibili le modalità di controllo **non di sintesi chimica** purché i mezzi e i metodi alternativi consentano un adeguato controllo degli organismi nocivi.



Per i dosaggi dei vari formulati commerciali, le indicazioni sui volumi da applicare e la miscelabilità tra i diversi prodotti impiegati si **rimanda esclusivamente alle informazioni riportate in etichetta**. Particolare attenzione deve essere posta alle limitazioni d'impiego (es. *buffer zone*). La responsabilità sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari rimane in capo all'utilizzatore.